

Bmab+FOLFOXIRI(大腸癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

Bmab+FOLFOXIRI(大腸癌)

Bmab+FOLFOXIRI(大腸癌)

作成日

2019/06/17

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
大腸癌	切除不能・再発	14日	12

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ベバシズマブ(5mg/kg)	CVポート	day1
2	イリノテカン(150mg/m ²)	CVポート	day1
3	オキサリプラチン(85mg/m ²)	CVポート	day1
4	レボホリナート(200mg/m ²)	CVポート	day1
5	フルオロウラシル(2400mg/m ²)	CVポート	day1~3

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(20ml)	静注	
	②	パロセトロン点滴静注バック(0.75mg/50ml) デキサメタゾン注(6.6mg) ファモチジン注(20mg)	CVポート	200mL/h:15分
	③	ベバシズマブ(5mg/kg) 生食(100ml) ※初回90分(67ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)	CVポート	67mL/h:90分
	④	イリノテカン(150mg/m ²) 生食(250ml)	CVポート	250mL/h:60分
	⑤	オキサリプラチン(85mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250ml)	CVポート	125mL/h:120分
	⑥	レボホリナート(200mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250ml) Rp⑤、⑥は同時に投与	CVポート	125mL/h:120分
	⑦	フルオロウラシル(2400mg/m ²) 生食(1000ml)	CVポート	23mL/h:46時間
day3	⑧	生食(50ml)	CVポート	200mL/h:15分
	⑨	ヘパリンNaロック(ヘパフラッシュ)		

備考

HECレジメンのため、アプレピタント必須、デキサメサゾンの減量なし
day1~3 アプレピタントカプセル併用

導入療法として12コースまで、13コース以降は維持療法としてBEV+I-LV+5-FU