

Cmab+FOLFIIRI(大腸癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

Cmab+FOLFIIRI(大腸癌)

Cmab+FOLFIIRI(大腸癌)

作成日

2019/11/07

| 適応病名 | 適応分類 | 1コースの日数 | 総コース回数 |
|------|------|---------|----------|
| 大腸癌 | 再発転移 | 14 | until PD |

| 番号 | 抗がん剤名 | 投与方法 | 投与日 |
|----|----------------------------------|-------|----------------|
| 1 | セツキシマブ(400mg/m ²) | CVポート | day1:1コース目 |
| 2 | セツキシマブ(250mg/m ²) | CVポート | day8:1コース目 |
| 3 | セツキシマブ(250mg/m ²) | CVポート | day1、8:2コース目以降 |
| 4 | イリノテカン(150mg/m ²) | CVポート | day1 |
| 5 | レボホリナート(200mg/m ²) | CVポート | day1 |
| 6 | フルオロウラシル(400mg/m ²) | CVポート | day1 |
| 7 | フルオロウラシル(2400mg/m ²) | CVポート | day1 |

| 投与日 | Rp | 薬品名 用量 コメント | 投与方法 | 投与速度 |
|------|----|---|-------|--------------|
| day1 | ① | 生食(20mL) | CVポート | |
| | ② | 生食(50mL) デキサメタゾン注(6.6mg) クロルフェニラミン注(5mg) ファモチジン注(20mg) ※アプレピタント併用時はDEXは4.95mg ※アプレピタント併用時はDEXは4.95mg | CVポート | 200mL/h:15分 |
| | ③ | グラニセトロン注(3mg/100mL) | CVポート | 200mL/h:30分 |
| | ④ | 【初回】250ml/h:2時間 セツキシマブ(400mg/m ²) 生食(500mL) 【2回目以降】250ml/h:1時間 セツキシマブ(250mg/m ²) 生食(250mL) | CVポート | 250mL/h |
| | ⑤ | 生食(50mL) | CVポート | |
| | ⑥ | イリノテカン(150mg/m ²) 生食(250mL) | CVポート | 166mL/h:90分 |
| | ⑦ | レボホリナート(200mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250mL) Rp⑥、⑦は同時に投与 | CVポート | 250mL/h:120分 |
| | ⑧ | フルオロウラシル(400mg/m ²) 5%ブドウ糖液(100mL) | CVポート | 450mL/h:15分 |
| | ⑨ | フルオロウラシル(2400mg/m ²) 生食(1000mL) | CVポート | 23mL/h:46時間 |
| day3 | ⑩ | 生食(50mL) | | 200mL/h:15分 |
| | ⑪ | ヘパリンNaロック(ヘパフラッシュ) | | |
| day1 | ⑫ | 生食(20mL) | CVポート | |
| | ⑬ | 生食(50mL) d-クロルフェニラミン(ポララミン注)5mg | CVポート | 200mL/h:15分 |
| | ⑭ | セツキシマブ(アービタックス注)250mg/m ² 生食(250mL) | CVポート | 250mL/h:60分 |

※生食よりセツキシマブ容量分抜く

⑮ 生食(50mL)

CVポート

200mL/h: 15分

備考

セツキシマブのライン: インラインフィルター0. 2又は0. 22ミクロンを使用する